

ALVEOTEN[®] 37,4 mg compresse

ALVEOTEN[®] 37,4 mg polvere per sospensione orale

ALVEOTEN[®] 37,4 mg/ 5 ml sospensione orale

Neltenexina monoidrato

COMPOSIZIONE

ALVEOTEN[®] 37,4 mg compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: neltenexina monoidrato mg 37,4

Eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato

ALVEOTEN[®] 37,4 mg polvere per sospensione orale

Ogni bustina contiene:

Principio attivo: neltenexina monoidrato mg 37,4

Eccipienti: saccarosio, sodio citrato, acido silicico, saccarina sodica, aroma pesca.

ALVEOTEN[®] 37,4 mg/ 5 ml sospensione orale

Un flacone da 120 ml contiene:

Principio attivo: neltenexina monoidrato mg 898

Eccipienti: gomma xantan, sodio fosfato bibasico 12 H₂O, potassio fosfato monobasico, sorbitolo soluzione al 70%, sodio citrato, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma amarena, acqua depurata .

FORMA FARMACEUTICA E CONFEZIONI

Compresse – Astuccio da 30 compresse

Polvere per sospensione orale – Astuccio da 30 bustine

Sospensione orale – 1 Flacone da 120 ml

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Mucolitico

TITOLARE A.I.C.

Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A.

Via Fossignano, 2 – 04011 Aprilia (LT)

PRODOTTO E CONTROLLATO DA

Compresse e bustine: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. Officina di Aprilia Via Fossignano, 2

Sospensione orale: S&B s.r.l. – OFFICINA FARMACEUTICA Via del Mare 36 - Pomezia (RM)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

CONTROINDICAZIONI

Pazienti con ipersensibilità accertata verso il farmaco e pazienti con alterazioni epatiche e renali.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Alveoten deve essere somministrato con cautela nei pazienti portatori di ulcera peptica. Alveoten non é teratogeno né embriotossico negli animali. Tuttavia, come per ogni nuovo farmaco, se ne sconsiglia l'uso nel primo trimestre di gravidanza. Nell'ulteriore periodo di gravidanza andrà somministrato solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI

Non sono note interazioni con altri farmaci

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Adulti: Compresse: 1 compressa (37,4 mg) 3 volte al dì

Polvere per sospensione orale: 1 bustina (37,4 mg) 3 volte al dì

Sospensione orale: 1 misurino (5 ml pari a mg 37,4) 3 volte al dì

Bambini: Oltre i 3 anni: sospensione orale: ½ misurino (2,5 ml pari a mg 18,7) 3 volte al dì

Le compresse vanno deglutite con un po' di acqua; il contenuto delle bustine deve essere sciolto in mezzo bicchiere di acqua. Assumere il prodotto preferibilmente dopo i pasti.

SOVRADOSAGGIO

Non sono noti incidenti acuti con Alveoten. In caso di sovradosaggio, non essendo noto un antidoto specifico, si consiglia di mettere in atto le usuali misure di emergenza quali l'induzione di vomito e la lavanda gastrica.

EFFETTI INDESIDERATI

Alle dosi consigliate Alveoten può talvolta provocare la comparsa di cefalea e di turbe digestive quali nausea e disturbi gastrointestinali. In tal caso la posologia dovrà essere opportunamente ridotta.

In caso di comparsa di qualsiasi altro effetto collaterale bisogna comunicarlo al proprio medico curante o al farmacista.

DATA DI SCADENZA

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL MEDICINALE DOPO LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

Data di revisione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco:
Giugno 2008