

**PRIMA DELL'USO**

LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

**DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

**EDEVEN C.M. 1%+5% gel**

**EDEVEN C.M. 2%+5% gel**

escina + dietilaminasalicilato

C.M.: composizione modificata (\*)

**CHE COSA È**

EDEVEN C.M. gel è un farmaco per uso topico.

**PERCHÉ SI USA**

EDEVEN C.M. gel si usa per la traumatologia minore (dolori articolari e muscolari conseguenti a traumi).

**QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

- Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
- EDEVEN C.M. gel non va impiegato su lesioni aperte (ferite), mucose ed aree cutanee trattate con radiazioni
- 

**PRECAUZIONI PER L'USO**

Non sussistono rischi di assuefazione e dipendenza.

Trattandosi di un preparato per applicazioni topiche, il suo uso deve essere esclusivamente esterno

L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione

**QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE**

Informate il medico o il farmacista se state assumendo o avete recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Non è nota alcuna interazione con altri medicinali o alimenti.

**E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

Il medicinale non deve essere applicato con altri prodotti.

***Quando può essere usato solo dopo avere consultato il medico***

Gravidanza e allattamento (vedere "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento")

### ***Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento***

Chiedete consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza e/o allattamento EDEVEN C.M. gel deve essere usato solo dopo aver consultato il medico ed aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. È tuttavia opportuno evitare l'uso prolungato (massimo 3 settimane) del prodotto su aree cutanee estese durante la gravidanza e l'uso sul seno durante l'allattamento. Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

### ***Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari***

EDEVEN C.M. gel non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

### **Informazioni importanti su alcuni eccipienti**

Non pertinente

### **Avvertenze doping**

Non pertinente

### **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

- **Quanto**

- Adulti e adolescenti (12-18 anni)**

- La quantità da applicare dipende dall'estensione dell'area da trattare.

- Generalmente si applica un sottile strato di EDEVEN C.M. gel sulla cute della zona da trattare.

- Attenzione: non superare le dosi indicate.

- **Quando e per quanto tempo**

- Applicare EDEVEN C.M. gel da 1 a 3 volte al giorno sulla zona da trattare.

- Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

- Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

- **Come**

- Applicare il gel direttamente sulla parte interessata. Dopo ogni applicazione lavarsi accuratamente le mani.

### **COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE**

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso sia stata applicata una dose eccessiva di EDEVEN C.M. gel, lavare accuratamente la parte interessata.

*In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di EDEVEN C.M. avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.*

**SE AVETE QUALSIASI DUBBIO SULL'USO DI EDEVEN C.M., RIVOLGETEVI AL MEDICO O AL FARMACISTA.**

### **EFFETTI INDESIDERATI**

*Come tutti i medicinali, EDEVEN C.M. può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.*

In rari casi possono comparire reazioni di ipersensibilità come rossore, desquamazione e disidratazione della pelle.

*Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.*

*Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico.*

### **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Scadenza: vedere la data di scadenza indicata sulla confezione.

La data si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare il medicinale a temperatura non superiore a 25°C.

*I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.*

**TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.**

*E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.*

### **COMPOSIZIONE**

(\*) C.M.: composizione modificata per eliminazione di un principio attivo (eparina sodica)

EDEVEN C.M. 1% + 5% gel

100 g di gel contengono

Principi attivi:

Escina 1 g

Dietilamina salicilato 5 g

Eccipienti:

essenza lavanda, essenza nerolene, carbossipolimetilene, meglumina, glicol propilenico, alcol etilico, sodio edetato, esildecano e esildecil laurato, etossidiglicol, butilidrossitoluolo, titanio diossido, acqua depurata.

EDEVEN C.M. 2% + 5% gel

100 g di gel contengono

Principi attivi:

Escina 2 g

Dietilamina salicilato 5 g

Eccipienti:

essenza lavanda, essenza nerolene, carbossipolimetilene, meglumina, glicol propilenico, alcol etilico, sodio edetato, esildecano e esildecil laurato, etossidiglicol, butilidrossitoluolo, titanio diossido, acqua depurata.

### **COME SI PRESENTA**

EDEVEN C.M. 1% + 5% si presenta in forma di gel per uso cutaneo;

il contenuto della confezione è di 40 g di gel

EDEVEN C.M. 2% + 5% si presenta in forma di gel per uso cutaneo;  
il contenuto della confezione è di 40 g di gel

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE**  
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.p.A.  
via Fossignano, 2 – 04011 Aprilia (LT)

**REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO:**  
Luglio 2010