

**PRIMA DELL'USO
LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SUL
FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
- Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

METEOSIM 40 mg compresse masticabili
(Simeticone)

COME SI PRESENTA

METEOSIM 40 mg compresse masticabili si presenta in forma di compresse masticabili. Il contenuto della confezione è di 50 compresse.

CHE COSA E'

Antimeteorico (favorisce l'eliminazione dei gas che si formano nel tratto gastrointestinale).

PERCHE' SI USA

METEOSIM si usa nel trattamento sintomatico del meteorismo gastro-enterico e dell'aerofagia dell'adulto.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

QUANDO USARLO SOLO DOPO AVER CONSULTATO IL MEDICO

In gravidanza e allattamento (vedere "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento").

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

In gravidanza e durante l'allattamento utilizzare il medicinale solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rischio/beneficio nel proprio caso.

PRECAUZIONI PER L'USO

Nessuna particolare precauzione, leggere attentamente il paragrafo "Quando non deve essere usato".

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo breve periodo di trattamento (circa 7 giorni). Le compresse masticabili contengono lattosio: se il paziente è a conoscenza di soffrire di intolleranza a qualche zucchero, consulti il medico prima di assumere il medicinale.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Adulti: 4 compresse al giorno (2 alla fine di ogni pasto principale)

Le compresse devono essere masticate.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza consiglio del medico.

Usare solo per brevi periodi di trattamento (circa 7 giorni). Non utilizzare per periodi prolungati senza il consiglio del medico.

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

Non sono riportati fenomeni di dosaggio eccessivo con l'uso di METEOSIM.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Meteosim si rivolga al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI

Meteosim è di solito ben tollerato.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Verificare la data di scadenza indicata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo tale data.

Conservare il medicinale nella confezione originale per riparare il prodotto dalla luce e dalla umidità.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

COMPOSIZIONE

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: simeticone 40 mg

Eccipienti: saccarina sodica, acido alginico, lattosio, sodio bicarbonato, povidone, calcio silicato monoidrato, metilcellulosa

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. Via Fossignano, 2 – Aprilia (LT)

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE:

Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A.

Officina di Aprilia - Via Fossignano, 2

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco:
Ottobre 2007